

Endocarditis infecciosa sobre falso tendón en la aurícula derecha.

Los falsos tendones son estructuras fibrosas o fibromusculares que se encuentran normalmente en el ventrículo izquierdo y suelen estar unidos a la pared ventricular o al tabique interventricular. Se han descrito casos raros de tendones falsos localizados en la aurícula izquierda. Presentamos un caso excepcional de un falso tendón localizado en la aurícula derecha y complicado con una endocarditis infecciosa.

Hombre de 57 años que ingresó en nuestro hospital por dolor súbito e impotencia funcional en la pierna derecha sin antecedente de traumatismo. La radiografía reveló una fractura patológica de fémur y el TAC mostró signos de osteomielitis e imágenes sugestivas de émbolos sépticos pulmonares. En los cultivos de la herida y hemocultivos se aislaron colonias de *Klebsiella pneumoniae*. Se realizó un ecocardiograma transesofágico que reveló una masa móvil sugestiva de vegetación en la aurícula derecha (asterisco imagen A), adherida a una estructura anómala compatible con un falso tendón (flecha imagen A). Este se extendía desde la vena cava inferior hasta la cara posterosuperior de la fosa oval y estaba suspendido libremente en la cavidad auricular. El paciente fue tratado con ceftriaxona durante 6 semanas, con resolución completa de la vegetación (imagen B).

